

NOTIZIARIO

SISCA



Giornata SISCA

07/nov/10

Follow - Up in Medicina Comportamentale

L'incontro è gratuito per tutti i soci SISCA in regola con l'iscrizione 2010

Modificazioni comportamentali nel gatto affetto da dolore cronico

L'osservazione del proprietario è un importante strumento di valutazione dell'algia

Il riconoscimento del dolore cronico è una delle maggiori difficoltà cliniche in medicina veterinaria. Uno studio ha inteso identificare uno strumento semplice e pratico utilizzabile da proprietari e veterinari per valutare il dolore cronico nel gatto, avvalendosi di metodologie psicometriche standard per definire e raggruppare tipi di comportamenti che si modificano con il dolore e per determinare la validità delle categorie risultanti mediante valutazione dell'impatto della terapia analgesica.

Lo studio ha ipotizzato che proprietari e veterinari potessero valutare il comportamento del gatto in accordo alle categorie comportamentali identificate e che le modificazioni di questi gruppi comportamentali fossero causate dal dolore. Per testare l'ipotesi che fosse effettivamente il dolore a indurre le modificazioni comportamentali osservate si somministrava un analgesico di provata efficacia nel gatto (meloxicam).

Le modificazioni comportamentali e dello stile di vita associate al dolore cronico nel gatto venivano raggruppate in quattro categorie comportamentali (mobilità, attività, pulizia personale e temperamento). Nello studio venivano inclusi 23 gatti affetti da dolore muscolo-scheletrico cronico diagnosticato attraverso l'esame clinico.

Si chiedeva ai proprietari di completare un questionario prima e 28 giorni dopo l'inizio di una terapia analgesica (meloxicam sospensione orale 0,5 mg/ml). In particolare, essi dovevano fornire una valutazione globale delle modificazioni comportamentali e indicare il grado di tali modificazioni osservate in ciascuna delle quattro categorie definite.

Si chiedeva inoltre al veterinario referente di fornire in maniera indipendente un punteggio globale prima e dopo il trattamento. Sia i proprietari che i veterinari segnalavano modificazioni significative del comportamento e dello stile di vita del gatto dopo la terapia analgesica. Non si osservavano differenze tra le valutazioni globali iniziali dei proprietari e dei veterinari, mentre esse differivano dopo 28 giorni. Il punteggio mediano dei proprietari diminuiva da 5 all'inizio a 3 dopo 28 giorni, mentre il punteggio mediano dei veterinari diminuiva da 5 all'inizio a 2 dopo 28 giorni.

Era presente una riduzione statisticamente significativa del punteggio dei proprietari per ciascuna delle quattro categorie con la riduzione maggiore nella categoria "attività".

Lo studio dimostra, concludono gli autori, che la valutazione da parte del proprietario delle modificazioni comportamentali e di stile di vita del proprio gatto è un metodo importante per identificare il dolore cronico in questi animali.

"A study of owner observed behavioural and lifestyle changes in cats with musculoskeletal disease before and after analgesic therapy" Bennett D, Morton C. J Feline Med Surg. 2009 Dec; 11 (12): 997-1004.

Maria Grazia Monzeglio Med Vet PhD
mg.monzeglio@evsrl.it

Follow Up in Medicina Comportamentale

07 novembre 2010, Palazzo Trecchi, Cremona

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Soggettività ed oggettività come criteri complementari per la valutazione del processo terapeutico: I° parte

G. Meterangelis

10.30 Pausa

11.00 Soggettività ed oggettività come criteri complementari per la valutazione del processo terapeutico: II° parte

G. Meterangelis

12.30 Pausa pranzo

14.00 Il follow up in medicina comportamentale: tavola rotonda con esperienze personali -

M.C. Catalani,

R. Colangeli, F. Fassola, S. Giussani, M.S. Nuovo, M. Possenti

17.00 Domande e discussione

17.30 Valutazione dell'apprendimento, consegna degli attestati e chiusura dei lavori